

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสสมาชิก ๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๐๑	กระถิน	<i>Leucaena leucocephala</i>	LEGUMINOSAE	ไม้ต้น	ใบประกอบแบบขนนก ดอกเล็กอัดแน่น กระจุกกลุ่ม	หลังสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๐๒	กระถิน ฉนวนรงค์	<i>Acaeia auriculaeformis</i>	MIMOSOIDEAE	ไม้ต้น	ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ผลเป็นฝักแบนบิดม้วน	ข้างประปา
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๐๓	กระบาก	<i>Angelica costata</i> Korth.	DIPTEROCARPACEAE	ไม้ต้น	เปลือกขรุขระ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกรูปไข่แกมรูปหอกปลายใบแหลม ขอบใบหยัก ออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นท่อเล็กๆ	หลังอาคาร ๒, ๓
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๐๔	กล้วยพัด	<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn.	STRELITZIACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นตั้งตรง สีน้ำตาล ไม่แตกกิ่งก้าน ลำต้นเป็นข้อสั้นๆ ลักษณะคล้ายปาล์ม	อาคาร ๓, ๔
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๐๕	กาหลง	<i>Bauhinia acuminata</i> L.	LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE	ไม้พุ่ม	เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาล ใบเดี่ยว กิ่งอ่อนมีขนสีขาวปกคลุม	ข้างสนามไตรฟอล์ฟ
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๐๖	ขี้เหล็ก	<i>Senna siamea</i> (Lam.) Irwin & Barneby	LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE	ไม้ต้น	ใบประกอบแบบขนนก รูปขอบใบขนานปลายมน ดอกช่อสีเหลือง ฝักแบนแคบ ค่อนข้างหนา สีน้ำตาลคล้ำ	อาคารพลศึกษา
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๐๗	คอแลน (กรวยป่า)	<i>Casearia grewiiifolia</i> Vent.	FLACOURTIACEAE	ไม้ต้น	เปลือกเรียบ หรืออ่อนเป็นสะเก็ดใหญ่ สีน้ำตาลเทา ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ดอก เล็ก สีขาว ออกเป็นช่อยาวถึง 12 ซม. ผล รูปกลม ถึงรูปกลมรี เมื่อสุกสีเหลือง สีส้ม หรือสีชมพู เมล็ดมีเยื่อหุ้ม	หลังอาคาร ๓
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๐๘	แคนา (แคป่า)	<i>Markhamia pierrei</i> Dop.	BIGNONIACEAE	ไม้ต้น	ใบประกอบแบบขนนกรูปรี ดอกช่อสีขาว ฝักยาวสีน้ำตาล เมล็ดมีปีกบางสีขาว	ข้างสนามฟุตบอล, ศูนย์วัฒนธรรม

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๐๙	อีเม็ง	<i>Dalbergia lanceolaria</i> L.F. var. <i>lakhonensis</i> (Gagnep.) Niyomdham	LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE	ไม้ต้น	เรื้อนยอดค่อนข้างกลม ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามง่ามใบและปลายกิ่ง ดอกรูปดอกถั่ว ขนาดเล็ก	หลังอาคาร ๑
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๑๐	ชวานชม	<i>Gahnia pulehella</i> Fouq.	CYPERACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นอวบน้ำ มียางสีขาว ดอกสีแดงอมชมพู	ข้างอาคาร ๒
รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๑๑	ตะโก	<i>Diospyros rhodocalyx</i> Kurz.	EBENACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นสีดำ ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปค่อนข้างกลม สีเขียวเข้ม เป็นมัน ผลทรงกลม สุกสีส้ม	อาคาร ๓
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๑๒	ตะคร้อ	<i>Schicichera oleosa</i> (Lour.) Oken	SAPINDACEAE	ไม้ต้น	เรื้อนยอดทรงรูปไข่ แตกกิ่งตามลำต้น ออกเป็นช่อแยกแขนงตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งดอก ผลสด ผลสุกสีน้ำตาล เนื้อสีเหลือง	ข้างสนามฟุตบอล
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๑๓	ตะแบก	<i>Laqerstroemia cuspidara</i> Wall.	LYTHRACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปรี แกมขอบขนาน ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง สีชมพูอมม่วง	ศูนย์วัฒนธรรม
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๑๔	ทรงบาดาล	<i>Senna sulfuria</i> (DC.excolla) Irwin & barneby	LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE	ไม้พุ่ม	ออกดอกเป็นช่อสีเหลือง	สนามหน้าเสาธง
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๑๕	ไทรทอง	<i>Fernandao altissima</i> Blume.	BIGNONIACEAE	ไม้ต้น	ใบรียาว หนา แข็ง ผลกลม สุกสีเหลือง กิ่งกระจายรอบต้น พุ่มทรงกลม	อาคาร ๑, ๒
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๑๖	ไทรย้อย	<i>Fernandao benjamina</i> L.	BIGNONIACEAE	ไม้ต้น	มีรากอากาศห้อยลงมาตามต้น ยางขาวข้นคล้ายน้ำมัน ใบเดี่ยว ดอกช่อผลสด รูปทรงกลม สุกมีสีชมพูอมม่วง	ข้างประปา
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๑๗	ประดู่บ้าน	<i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE	ไม้ต้น	ใบประกอบแบบขนนก ดอกช่อสีเหลือง รูปดอกถั่ว ผลแห้งสีน้ำตาลรูปโล่	สนามบาสเก็ตบอล
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๑๘	ประดู่ป่า	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz.	LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE	ไม้ต้น	ใบประกอบแบบขนนก ดอกช่อสีเหลือง รูปดอกถั่ว ผลแห้งสีน้ำตาลรูปโล่	ข้างหอประชุม
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๑๙	พญาสัตบรรณ	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R.Br.	APOCYNACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นมียางสีขาว ดอกเป็นช่อสีขาว ผลเป็นฝักเรียวยาว	หลังอาคาร ๓, หน้าเสาธง

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๒๐	พะยอม	<i>Shorea roxburghii</i> G.Don	DIPTEROCARPACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยว ขอบใบเป็นคลื่น ดอกช่อสีขาวกลิ่นหอม ผลแห้งมีปีกยาวสามปีก ปีกสั้นสองปีก	หลังอาคาร ๓, หน้า ห้องสำนักงานบริหาร ทั่วไป
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๒๑	พะยุง	<i>Dalbergia cochinchinensis</i> Pierre	LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE	ไม้ต้น	เรือนยอดทรงกลม ใบประกอบแบบขนนก	หลังอาคารฝ่ายบริหาร ทั่วไป
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๒๒	พิกุล	<i>Mimusops elenqi</i> L.	SAPOTACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปรีแกมขอบขนาน ดอกเดี่ยว สีขาว กลิ่นหอม ผลรูปไข่ สุกมีสีส้มแดง	หลังสำนักงานฝ่าย บริหารทั่วไป
รหัสพรรณไม้	ชื่อ พื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๒๓	พุท	<i>Ixora brevidens</i> Craib	RUBIACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยวแตกเป็นคู่ตรงกันข้าม ออกตามข้อของกิ่ง ใบรูปมนรี ปลายใบแหลม ดอกเดี่ยว สีขาว กลิ่นหอม	หน้าอาคาร ๑, ๓
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๒๔	โพ	<i>Ficus rumphii</i> Blume.	MORACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยวรูปหัวใจ ปลายใบยาวคล้ายหาง มีหูใบหุ้มยอดอ่อน สีครีมหรืออมชมพู ผลกลม ชมพูอมม่วง	หลังสำนักงานฝ่าย บริหารทั่วไป
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๒๕	มะเลื่อม	<i>Canarium sunbulatum</i> Guillaumin	BURSERACEAE	ไม้ต้น	เปลือกสีน้ำตาลอมเทา ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ขอบใบหยักมน ท้องใบมีขนสาก ดอกเป็นช่อแบบกระจุก กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ผลกลมรี ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลืองปนเขียว	ข้างอาคารคหกรรม
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๒๖	มะเกลือ	<i>Diospyros mollis</i> Griff.	EBENACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นสีน้ำตาลเข้ม ใบเรียงสลับ เป็นใบเดี่ยวรูปไข่ ใบเรียวยาว แหลม โคนใบมน ผลสดรูปร่างกลมเปลือกแข็ง ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีดำ เมล็ดรูปรี มี ๖ เมล็ดต่อ ๑ ผล	หน้าอาคาร ๒
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๒๗	มะขาม	<i>Tamarindus indica</i> L.	LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE	ไม้ต้น	ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับรูปขอบขนาน ดอกช่อ กลีบดอกสีเหลือง มีลายสีม่วงแดง ฝักสีน้ำตาล เนื้อในสี น้ำตาลเข้ม	หน้าอาคาร ๓
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๒๘	มะขามป้อม	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	EUPHORBIACEAE	ไม้ต้น	เรือนยอดแผ่กว้างรูปร่มหรือโปร่งกลม ใบเดี่ยวคล้ายใบ มะขามสั้นมาก ผลทรงกลมสีเขียวใส มีเส้นริ้วๆ ตามยาว	หลังอาคาร ๒, ๓ ข้างอาคารพลศึกษา

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๒๙	มะพร้าว	<i>Cocos nucifera</i> L.	PALMAE	ปาล์ม	ก้านใบออกรอบต้น ใบเป็นทางยาว ออกเป็นสองด้านของก้าน ผลออกเป็นทลาย	ศูนย์วัฒนธรรม
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๓๐	มะพอก	<i>Parinari anamense</i> Hance	CHRYSOBALANACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ ผลกลมรี ผิวขรุขระมีเกล็ดสีน้ำตาลคลุม	ข้างประปา
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๓๑	มะม่วง	<i>Mangifera indica</i> L.	ANACARDIACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยว มีกลิ่นหอม ดอกช่อขนาดเล็ก สีน้ำตาล ผลดิบมีรสเปรี้ยว ผลสุกสีเหลืองรสหวาน	ข้างสนามบาสเก็ตบอล
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๓๒	มะม่วงป่า	<i>Mangifera pentandra</i> Hook.f.	ANACARDIACEAE	ไม้ต้น	ใบหนา ปลายใบแหลม ผลขนาดเล็กมียางมาก	หลังอาคาร ๑, ข้างอาคาร ๒
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๓๓	มะม่วง หิมะพานต์	<i>Ancardium occidentale</i> L.	ANACARDIACEAE	ไม้ต้น	ผลแยกออกจากปลายผลเทียม	ฟุตบอลข้างสนาม ฟุตบอล
รหัสพรรณไม้	ชื่อ พื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๓๔	มะหาด	<i>Celtis tetradra</i> Roxb.	ALMACEAE	ไม้ต้น	เปลือกน้ำตาลไหม้เป็นลายแตกละเอียด ขอบใบมีริ้วมีขน ผลสีเขียว สุกสีเหลือง	ข้างอาคาร ๒
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๓๕	โมก	<i>Wrightia pubescens</i> R.Br.	APOCYNACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ดอกช่อสีขาว คว่ำหน้าลง กลิ่นหอม ฝักเรียวยาว ออกเป็นคู่ เมล็ดสีน้ำตาล	หลังอาคาร ๒, ๓
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๓๖	โมกซ้อน ต่าง	<i>Wrightia religiosa</i> Benth. ex Kurz	APOCYNACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นเป็นปุ่ม ใบเดี่ยวสีเขียวสลับขาว ดอกช่อสีขาว ช่อดอกคว่ำลง	อาคาร ๓, ฟุตบอลข้าง สนามฟุตบอล
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๓๗	โมกหลวง (โมกมัน)	<i>Holarrhena pubescens</i> Wall. Ex G.Don	APOCYNACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยวเรียงตัวตรงข้าม รูปไข่ ดอกเป็นช่อกระจุกซ้อน ผลแห้งแตก	หน้าอาคารบริหารงาน ทั่วไป
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๓๘	ยอป่า	<i>Polyosma arguta</i> Craib	GROSSULARIACEAE	ไม้ต้น	เปลือกต้นสีน้ำตาลแดง ใบเดี่ยวออกตรงข้ามรูปไข่ ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายยอดสีขาว ดอกย่อยบานไม่พร้อมกัน มี 5 กลีบ บานอยู่ได้วันเดียวก็โรย	
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๓๙	ยูคาลิปตัส	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	MYRTACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นเรียบ เปลือกแตกร่อนออก ใบเรียงสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปรีมน ใบมีกลิ่นฉุน	ข้างสนามฟุตบอล

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๔๐	รัง	<i>Shorea siamensis</i> Miq.	DIPTEROCARPACEAE	ไม้ต้น	เปลือกสีเทา แตกเป็นร่อง ตามความยาวลำต้น ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ ปลายใบมน โคนใบหยักเว้า ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อ ผลรูปกระสวย มีปีกยาวสามปีก ปีกสั้นสองปีก	หลังอาคาร ๒
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๔๑	ราชพฤกษ์	<i>Cassia fistula</i> L.	LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE	ไม้ต้น	ใบประกอบแบบขนนก ดอกช่อสีเหลืองสด ห้อยระย้า ฝักทรงกระบอกสีดำหรือน้ำตาลเข้ม	ข้างสนามฟุตบอล
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๔๒	ลำควน	<i>Melodorum fruticosum</i> Lour.	ANNONACEAE	ไม้ต้น	เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกขรุขระเป็นสะเก็ด ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบใบขนาน ดอกสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม	ข้างอาคาร ๑, หลังอาคาร ๒, ๓
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๔๓	สน ประติพัทธ์	<i>Casuarina junghuhniana</i> Miq.	CASUARINACEAE	ไม้ต้น	เรือนยอดรูปกรวยแหลม ใบเล็กแหลมติดอยู่ตามข้อของกิ่งย่อย ผลมีผิวแข็งเรียงอัดกันเป็นก้อนกลม ๆ	ข้างอาคาร ๑, ๒
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๔๔	สนแผง	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold & Zucc.) Endl.	CUPRESSACEAE	ไม้ต้น	ใบเป็นเกล็ดขนาดเล็ก เรียงติดกันแน่นกับกิ่ง และแผ่เป็นแผง	อาคาร ๑, ๒
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๔๕	สนมังกร	<i>Juniperus chinensis</i> L.	CUPRESSACEAE	ไม้ต้น	ใบเป็นเกล็ดขนาดเล็ก เรียงติดกันแน่น	หน้าอาคาร ๓
รหัสพรรณไม้	ชื่อ พื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๔๖	สะเดา	<i>Azadirachta indica</i> A. Juss. Var indica	MELIACEAE	ไม้ต้น	ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ใบอ่อนสีม่วงรูปหอก โคนเล็กน้อย ดอกช่อสีขาว ผลสดสุกสีเหลือง	หลังอาคาร ๒
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๔๗	สะแบง	<i>Dipterocarpus intricatus</i> Dyer	DIPTEROCARPACEAE	ไม้ต้น	เปลือกแตกเป็นร่องลึกยาวหรือแตกเป็นสะเก็ดตามขวาง ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบรูปไข่หรือรูปไข่แกมขอบขนาน ปลายมน โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนมีขนหยาบและสาก ด้านล่างมีขนยาว รูปดาว ดอกช่อแบบช่อแยกแขนงออกตามซอกใบ กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกบิดรูปก้าน สีขาวแซมแดงผลรูปรางค์จอก เป็นจิบพื้นและมีปีก 5 ปีก ปีกสั้นสามปีก	หลังอาคารสำนักงาน บริหารทั่วไป

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๔๘	สัก	<i>Vartica harmandiana</i> Pierre	DIPTEROCARPACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบสากมีขน รูปวงรีขนาด ใหญ่ ดอกช่อออกที่ปลายยอด	ข้างประตูโรงเรียน
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๔๙	ลำต้น (สั้น)	<i>Dillenia obovata</i> (Blume) Hoogland	DILLENACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับรูปไข่ ดอกช่อ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สี เขียวกลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับสีเหลือง ผลรูปกลมแบน สุกสีส้ม	
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๕๐	สาละ	<i>Shorea robusta</i> C.F. Garetn.	DIPTEROCARPACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นสีน้ำตาล แตกเป็นร่อง ใบเดี่ยวดอกออกตามหุบ ผลสด	ข้างศูนย์วัฒนธรรม
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๕๑	หมากเขียว	<i>Ptychosperma elegans</i> Blume.	PALMAE	ปาล์ม	ใบประกอบแบบขนนก ดอกช่อสีขาว กลิ่นหอม ผลกลมรี สุกสีแดง	หน้าอาคาร ๓
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๕๒	หมากนวล	<i>Veitchia merrillii</i> (Becc.) H.E. Moore	PALMAE-ARECACEAE	ปาล์ม	ลำต้นสีน้ำตาล ใบประกอบแบบขนนก กาบใบสีเขียว มี วนสีขาวปกคลุม ดอกช่อผลรูปไข่ ปลายแหลม สุกสีแดง	อาคาร ๓, ข้างสนาม ฟุตบอล
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๕๓	หมาก เหลือง	<i>Chrysalidocarpus</i> <i>lutescens.</i> H. Wendl.	PALMAE	ปาล์ม	ลำต้นผิวเรียบสีเหลืองส้มถึงเขียว มีข้อเห็นได้ชัดเจน	อาคาร ๑, ๒, ๓
รหัสพรรณไม้	ชื่อ พื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะ วิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๕๔	มุ่น	<i>Elaeocarpus lanceifolius</i> Roxb.	ELAEOCARPACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปมนหรือรูป ไข่กลับ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน เนื้อใบค่อนข้างหนา เป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกเป็นช่อ ก้านช่อมีขนนุ่ม ดอกสีขาวปน เหลืองอ่อนๆ ผล รูปป้อม ผิวเรียบ สีเขียวอ่อน หัวและท้าย มน	หลังอาคาร ๓

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๕๕	หว้า	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	MYRTACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยวรูปไข่ ปลายใบแหลม ค่อนข้างหนา สีเขียวเข้ม ผิวมัน ดอกช่อผลรูปไข่ สุกสีม่วงอมดำ	หลังอาคาร ๑
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๕๖	หางนกยูงฝรั่ง	<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE	ไม้ต้น	ดอกออกที่ปลายยอด กลีบดอก ๕ กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน สีแดงอมส้ม ผลเป็นฝักแข็ง	สนามบาสเก็ตบอล
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๕๗	เหลียงสิรินธร	<i>Tabebuia argentea</i> Britt.	BIGNONIACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นสูง ออกรูประฆังสีเหลือง ผลแห้งแตกแบบฝักกาด	สนามหน้าเสาธง
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๕๘	อด	-	-	ไม้ต้น	ลำต้นสูง ใบขนนกปลายคี่เรียงตัวตรงข้าม ใบรูปขอบขนาน ปลายแหลมโคนใบมน ขอบใบเรียบ ใต้มีขนสั้นนุ่มมีต่อมคล้ายกำมะหยี่ ออกดอกเป็นช่อแบบหางกระรอกสีเหลือง	ข้างอาคาร ๒
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๕๙	อโศกเขนคาเบรียล (อโศกอินเดีย)	<i>Pollia longifolia</i> (Benth.) Hook.f.	ANNONACEAE	ไม้ต้น	เรือนยอดเป็นรูปปิรามิดสูง ใบรูปใบหอกแคบ ปลายเรียวแหลม ขอบใบหยักเป็นครึ่ง	อาคาร ๑
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๖๐	อะราง	<i>Peltophorum dasyrachis</i> (Miq.) Kurz.	LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE	ไม้ต้น	เปลือกต้นเรียบสีเทาปนน้ำตาล ยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดงคลุมหนาแน่น ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียงสลับ ช่อใบแขนงเรียงตรงข้าม ปลายใบมนเว้าตื้น ตรงกลาง โคนใบเบี้ยว ผิวใบด้านบนเกลี้ยงด้านล่างมีขนสีน้ำตาลแดง ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ผลเป็นฝักแห้งแก่ไม่แตก ทรงแบน เปลือกสีน้ำตาลแดง เมื่อแก่สีดำ	ข้างรั้วด้านหน้าโรงเรียน
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๖๑	อินทนิลน้ำ	<i>Laqerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	LYTHRACEAE	ไม้ต้น	เปลือกลำต้นสีดำ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ดอกช่อสีม่วง ผลรูปไข่แต่มีสีน้ำตาล ผลเล็ก	ข้างสนามบาสเก็ตบอล
รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๖๒	อินทนิลบก	<i>Laqerstroemia macrocarpa</i> Wall.	LYTHRACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ดอกช่อสีม่วงอมชมพู กลีบดอกย่น ผลรูปไข่ แก่สีน้ำตาล ผลใหญ่	ข้างสนามฟุตบอล

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๖๓	กก	<i>Cyperus imbricatus</i> Retz.	CYPERACEAE	ไม้ล้มลุก น้ำ	ลำต้นกลมเรียบ ใบอยู่บนปลายสุดลำต้น	อาคาร ๑
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๖๔	บัวสาย	<i>Nymphaea pubescens</i> Willd.	NYMPHAEACEAE	ไม้ล้มลุก น้ำ	ดอกสีขาว ก้านดอกเป็นสายลงไปใต้น้ำ	อาคาร ๒
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๖๕	सान้อย ประแป้ง	<i>Dieffenbachia sequine</i> (Jacq.) Schott.	ARACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นกลม ใบต่างขาตามเส้นใบ	หน้าอาคารฝ่าย บริหารงานบุคคล
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๖๖	กุหลาบหนู	<i>Rosa chinensis</i> Jacq. var. <i>minima</i> Voss	ROSACEAE	ไม้พุ่ม	กลีบดอกหลายชั้น มีสีสด	หน้าเสาธง, อาคาร ๒, ๓
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๖๗	แก้ว	<i>Schoepfia fragrans</i> Wall.	OLACACEAE	ไม้ต้น	ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ผลรูปไข่ ปลายทู่	อาคาร ๒, สำนักงาน บุคคล
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๖๘	โกสุม	<i>Codiaeum variegatum</i> Blume.	EUPHORBIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยวรูปรียาวาวบิดเวียนเป็นเกลียว มีหลายสีปนกัน สี เขียว เหลือง แดง ชมพู ม่วง	หน้าอาคาร ๓
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๖๙	เข็ม	<i>Ixora javanica</i> (Blume.) DC.	RUBIACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นสีน้ำตาลเป็นข้อปล้อง มีใบเดี่ยว ทรงพุ่ม ปลายใบ แหลม ดอกช่อแบบซี่ร่ม ดอกมีสีแดงเป็นรูปเข็ม ผลสีเขียว	สวนหย่อมหน้าอาคาร ๑
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๗๐	เข็มญี่ปุ่น	<i>Ixora stricta</i> Roxb.	RUBIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบมีขนาดเล็ก ขอบใบขนาน โคนใบโค้งมน ปลายใบ แหลม ดอกช่อสีแดงอมส้ม	อาคาร ๑
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๗๑	เข็มสามสี	<i>Dracaena cincta</i> Bak. Cv. Tricolor	AGAVACEAE	ไม้พุ่ม	กิ่งจะแตกตามข้อของลำต้น ใบแคบ ปลายใบแหลม ใบมี สามสี แดง ครีมี เขียว	อาคาร ๓, ฟุตบาทข้าง สนามฟุตบอล, อาคาร สำนักงานฝ่ายบริหาร ทั่วไป
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๗๒	ครุฑต่าง	<i>Polyscias guilfoylei</i> L.H. Bailey	ARALIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบสีเขียวสลับขาว เป็นใบประกอบมีใบย่อย ๕ - ๗ ใบ ขอบใบหยัก ขยี้ใบจะมีกลิ่นฉุน	อาคาร ๒
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๗๓	จันทน์ผา	<i>Dracaena loureiri</i> Gagnep.	DRACAENACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยวออกเวียนสลับใกล้ปลายยอด เรียวยาว ปลายใบ แหลม ก้านผบเป็นกาบหุ้มลำต้น ดอกช่อสีขาว	ศูนย์วัฒนธรรม

รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๗๔	ชบา	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	MALVACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยวรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบหยัก ดอกสีแดง รูปร่างคล้ายแตร มีก้านอับเรณูยาว เกสรตัวผู้สีเหลืองจำนวนมาก	อาคาร ๒
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๗๕	ชาฮกเกี้ยน	<i>Carmona retusa</i> (Vahl) Masam.	BORAGINACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นแตกกิ่งก้านจำนวนมาก ใบเดี่ยวเรียงสลับ ออกดอกเป็นกระจุกสั้นๆ ตามกิ่ง ดอกสีขาวตามซอกใบ ผลสีส้มแดง	อาคาร ๑
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๗๖	ชองออฟจาไมก้า	<i>Dracaena reflexa</i> (Decne.) Lam.	AGAVACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นตั้งตรง สีน้ำตาล ใบเดี่ยวแผ่เป็นกาบ เวียนสลับถี่ตอนปลายยอด ขอบใบสีเหลือง กลางใบสีเขียว	อาคาร ๑, ๒
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๗๗	เทียนทอง	<i>Duranta erecta</i> L.	VERBENACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยวรูปรีถึงรูปไข่ ขอบใบหยัก	ฟุตบอลข้างสนาม ฟุตบอล, สวดย่อม อาคาร ๑
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๗๘	นือออน	<i>Leucophyllum frufescens</i> (Berl.) Johnson	SCROPHULARIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบด้านบนสีเขียวเทา มีขน ใบอ่อนนุ่ม ดอกสีม่วงหรือชมพูอมม่วงแดง	สวนหย่อมอาคาร ๑
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๗๙	ประทัดฟิลิปปินส์	<i>Hamelia patens</i> Jacq.	RUBIACEAE	ไม้พุ่ม	ลำต้นแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกลม กิ่งก้านสีน้ำตาลแดง ดอกสีส้มแดง ออกเป็นช่อแบบกระจุกตามซอกใบและกิ่ง	ฟุตบอลข้างสนาม ฟุตบอล
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๘๐	ปัดดาเวีย	<i>Jatropha integerrima</i> Jacq.	EUPHORBIACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยวขอบใบหยักเว้าลึกเป็นสามแฉก ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง สีแดง ผลมีสามพู	หน้าอาคาร ๓
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๘๑	ผกากรอง	<i>Lantana trifolia</i> L.	VERBENACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ใบรูปไข่ ปลายใบมนกึ่งแหลม โคนใบมน ขอบใบหยัก ใบมีขนสั้น สากมือ ดอกช่อสีเหลือง ขาวแดง ส้ม มีกลิ่นฉุน	ข้างสนามไคร์ฟกอล์ฟ
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๘๒	แพงพวย	<i>Ludwigia adscendens</i> (L.) H. Hara.	ONAGRACEAE	ไม้พุ่ม	ดอกมีสีขาวถึงชมพูเข้ม มีสีแดงตรงกลางดอก	อาคารสำนักงานฝ่าย บริหารงานบุคคล
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๘๓	เล็บครุฑ	<i>Polyseias fruticosa</i> (L.) Harms.	ARALIACEAE	ไม้พุ่ม	ขอบใบหยัก ใบเรียวเล็ก	อาคาร ๓

๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๘๔	วาสนา	<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	DRACAENACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ โกล่ปลายยอดสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกช่อกลิ่นหอม	อาคาร ๒
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๘๕	หุบลาช่อน	<i>Aster cordifolius</i> L.	COMPOSITAE	ไม้พุ่ม	ใบกลมขนาดคล้ายหูหรือหางปลาช่อน	ข้างอาคาร ๑, ๒
รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๘๖	อากาเว่ (ศรนารายณ์)	<i>Agave angustifolia</i> Haw.	AGAVACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบเดี่ยวหนา โคนแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น ปลายใบแหลมแข็ง ขอบใบเป็นหนามแหลม	หน้าอาคาร ๒, ๓
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๘๗	เอื้อง หมายนา	<i>Costus speciosus</i> (J.G. Koenig) Sm.	COSTACEAE	ไม้ล้มลุก	มีรากใต้ดิน ออกเป็นกอแน่น ใบรูปหอกปลายแหลม ออกดอกที่ปลายลำต้นรูปไข่สีเขียวปนแดง ผลรูปไข่สีแดง	
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๘๘	เฟื่องฟ้า	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy.	NYCTAGINACEAE	ไม้รอเลื้อย	ลำต้นมีหนามแหลม ใบเดี่ยวรูปไข่ ใบอ่อนสีน้ำตาลอมแดง ใบประดับสีชมพูเข้ม สีแดง ดอกช่อแบบกระจุก ติดที่กลางใบประดับ	สวนหย่อมอาคาร ๑
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๘๙	เฟื่องฟ้า ใบด่าง	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy.	NYCTAGINACEAE	ไม้รอเลื้อย	ใบเดี่ยวรูปไข่ มีสีขาวเขียวสลับกัน ออกดอกเป็นช่อกระจุก มีใบประดับสามกลีบ ดอกขนาดเล็กสีขาว โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปหลอด	พุดบารข้างสนาม พุดบอล
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๙๐	ไผ่ตง	<i>Dendrocalamus asper</i> (Roem % Schult) Backer ex Heyne	GRAMINEAE	ไผ่	ลำต้นสีเขียว เนื้อไม้บาง	ข้างตู้ขายน้ำดื่มชั้นดิว
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๙๑	กล้วยน้ำว้า	<i>Musa sapientum</i> L.	MUSACEAE	ไม้ล้มลุก	กาบใบหุ้มซ้อนกันแน่น ก้านใบกลมหนา ด้านบนเป็นร่องลึก ใบยาวและใหญ่ ดอกห้อยย้อยลงมา	ศูนย์วัฒนธรรม
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๙๒	พลับพลึง	<i>Crinum asiaticum</i> L.	AMARYLLIDACEAE	ไม้ล้มลุก	ลำต้นใต้ดิน ใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้นเรียงเวียนสลับใกล้ผิวดิน ดอกช่อสีขาว กลิ่นหอม หน้าห้องดนตรีไทย	หน้าห้องดนตรีไทย
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๙๓	พลับพลึง ตีนเป็ด	<i>Hymenocallis littoralis</i> Salisb.	AMARYLLIDACEAE	ไม้ล้มลุก	ลำต้นใต้ดิน ใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้นเรียงเวียนสลับใกล้ผิวดิน ดอกช่อสีขาว กลิ่นหอม หน้าห้องดนตรีไทย	อาคาร ๓
๗-๔๕๑๙๐-๐๐๑-๐๙๔	ว่าน กาบหอย	<i>Tradescantia spanthacea</i> Stearn.	COMMELINACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบเดี่ยวเรียงซ้อนเป็นวงรอบ รูปใบหอกปลายแหลม แผ่นใบหนา ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีม่วงแดง	สวนหย่อมอาคาร ๓

